

**Листок-вкладыш – информация для пациента**  
**МУПОБЕЛ<sup>®</sup>, 2%, мазь для наружного применения**  
Действующее вещество: мупироцин

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат МУПОБЕЛ<sup>®</sup>, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата МУПОБЕЛ<sup>®</sup>.
3. Применение препарата МУПОБЕЛ<sup>®</sup>.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата МУПОБЕЛ<sup>®</sup>.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат МУПОБЕЛ<sup>®</sup>, и для чего его применяют.**

Препарат МУПОБЕЛ<sup>®</sup> содержит действующее вещество мупироцин, которое относится к группе лекарственных препаратов под названием «антибиотики и противомикробные средства», и используется для лечения инфекционных поражений кожи, вызванных микроорганизмами, такими как бактерии.

**Показания к применению**

Препарат МУПОБЕЛ<sup>®</sup> является местным антибактериальным средством, активным в отношении организмов, ответственных за большинство кожных инфекций, например *Staphylococcus aureus*, включая штаммы, устойчивые к метициллину, другие стафилококки, стрептококки. Он также активен против грамотрицательных организмов, таких как *Escherichia coli* и *Haemophilus influenzae*.

Мазь МУПОБЕЛ<sup>®</sup> используется при кожных инфекциях, например, при импетиго, фолликулите, фурункулезе.

Если улучшение не наступило, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

**2. О чем следует знать перед применением препарата МУПОБЕЛ<sup>®</sup>**

**Противопоказания**

**Не применяйте препарат МУПОБЕЛ<sup>®</sup>**

- Если у Вас аллергия (повышенная чувствительность) на мупироцин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- Если Вы используете интраназально (через нос) и интраокулярно (внутри глаза);
- Если у Вас диагностирована почечная недостаточность средней и тяжелой степени.

**Особые указания и меры предосторожности**

Перед приемом препарата МУПОБЕЛ<sup>®</sup> проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Обязательно проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом, если:

- У Вас заболевание почек;
- Вы пациент пожилого возраста.

Прекратите применение препарата МУПОБЕЛ® и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если после применения препарата МУПОБЕЛ® у Вас появились следующие реакции:

- диарея (жидкий стул 3 и более раз в сутки, возможно с примесью крови и слизи), боль в животе по типу спазмов, повышение температуры тела – признаки воспаления кишечника вследствие применения антибиотика (симптомы псевдомембранозного колита).

Немедленно прекратите применение препарата, по возможности удалите препарат с кожи и обратитесь за медицинской помощью при развитии у Вас любых симптомов острой аллергической реакции или тяжелых кожных реакций: отек лица (губы, веки, щеки) и слизистой рта, который может распространяться на гортань, вызывая затруднение дыхания и охриплость голоса, генерализованная кожная сыпь, кожный зуд или покраснение кожи с образованием пузырей.

Избегайте попадания мази в глаза. При попадании препарата в глаза следует промыть их большим количеством воды до полного удаления остатков мази.

Препарат МУПОБЕЛ® не следует применять для лечения глаз, наносить его внутрь носа, в сочетании с использованием катетера, а также в месте введения центрального венозного катетера.

#### **Другие препараты и препарат МУПОБЕЛ®**

Какого-либо взаимодействия препарата МУПОБЕЛ® с другими лекарственными средствами не зарегистрировано. Не наносить одновременно с другими препаратами местного применения.

#### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

##### *Беременность*

Сообщите своему лечащему врачу, если Вы подозреваете, что беременны, можете быть беременны или планируете забеременеть, поскольку препарат МУПОБЕЛ® противопоказан при беременности. Ваш лечащий врач обсудит с вами потенциальные риски приема препарата МУПОБЕЛ® во время беременности.

Если есть вероятность наступления беременности, Вам следует использовать эффективные средства контрацепции во время лечения.

##### *Грудное вскармливание*

Неизвестно, могут ли компоненты препарата МУПОБЕЛ® попадать в грудное молоко. Если Вы кормите грудью, Вы должны проконсультироваться со своим врачом, прежде чем применять препарат МУПОБЕЛ®. Если препарат используется для обработки трещин сосков во время грудного вскармливания, он должен быть смыт перед кормлением грудью.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Препарат МУПОБЕЛ® не влияет на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами.

### **3. Применение препарата МУПОБЕЛ®**

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

#### **Рекомендуемая доза**

##### *Взрослые/дети/пожилые пациенты*

Препарат наносится 2-3 раза в день.

Частоту нанесения и длительность лечения должен контролировать Ваш лечащий врач.

Максимальная продолжительность лечения - 10 дней.

### **Путь и (или) способ введения**

Препарат МУПОБЕЛ® предназначен для наружного применения.

Небольшое количество мази наносится на поврежденный участок кожи тонким слоем. На обработанный участок может быть наложена повязка.

Нельзя наносить МУПОБЕЛ® совместно с другими препаратами в связи с возможным растворением мупироцина и снижением его стабильности, что может привести к недостаточному антибактериальному эффекту.

После обработки кожи необходимо вымыть руки для удаления остатков мази.

Любые неиспользованные остатки препарата после окончания лечения должны быть уничтожены.

### **Если Вы применили препарат МУПОБЕЛ® больше, чем следовало**

Проблемы с передозировкой этого лекарства маловероятны. Если Вы случайно проглотили препарат МУПОБЕЛ®, обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

#### **Сообщите врачу, если у Вас появятся:**

**Часто** (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- кожные реакции гиперчувствительности:

- крапивница,
- зуд,
- покраснение кожи (эритема),
- жжение в месте нанесения мази,
- контактный дерматит,
- сыпь;

**Очень редко** (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000):

- системные аллергические реакции:

- тяжёлая аллергия (анафилаксия),
- сыпь по всему (большей части) телу (генерализованная сыпь),
- крапивница,
- отёк век, лица или губ, языка и горла, вызывающий сильное затруднение дыхания (ангионевротический отек).

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете собрать больше сведений о безопасности препарата.

#### **Республика Казахстан**

Адрес: 010000 г. Астана, ул. А. Иманова, 13 РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Телефон: +7 (7172) 235-135 (единый call-центр)

Электронный адрес: [farm@dari.kz](mailto:farm@dari.kz)

Сайт: <https://www.ndda.kz>

#### **4. Хранение препарата МУПОБЕЛ®**

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на блистере и картонной пачке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25°C в сухом, защищенном от света месте.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

#### **5. Содержимое упаковки и прочие сведения**

**Препарат МУПОБЕЛ® содержит:**

Действующим веществом является мупироцин

1 г мази содержит 20 мг мупироцина.

*Вспомогательные вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата:* полиэтиленгликоль (ПЭГ) 400, полиэтиленгликоль (ПЭГ) 4000Р.

#### **Внешний вид препарата МУПОБЕЛ® и содержимое его упаковки**

Мазь для наружного применения

Однородная мазь мягкой консистенции белого или почти белого цвета, свободная от посторонних включений.

По 15 г или 30 г препарата помещают в алюминиевые тубы, закупоренные пластиковой крышкой.

По 1 тубе вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках помещают в пачку картонную.

#### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Республика Казахстан

АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика»

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 162 Е.

Номер телефона: (+7 727) 399-50-50

Адрес электронной почты: [nobel@nobel.kz](mailto:nobel@nobel.kz)

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика»

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, 162 Е.

Номер телефона: (+7 727) 399-50-50

Адрес электронной почты [nobel@nobel.kz](mailto:nobel@nobel.kz)

#### **Листок-вкладыш пересмотрен**

#### **Прочие источники информации**

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза <https://ecc.eaeunion.org/>.

ТІЛІГЕН, НӨМІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ МӘРКЕЗІ  
БЕКІТІЛГЕН /  
ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СЕРТИФИЦИРОВАНО

ПЕЧАТЬЮ

(на 4 листах)

ПАРАК / ЛИСТОВ

КҮНІ / ДАТА 2001.2026

