

УТВЕРЖДЕНА  
Приказом председателя Комитета  
контроля медицинской и  
фармацевтической деятельности  
Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

**Инструкция по медицинскому применению  
лекарственного средства**

**ПАЛОРА®**

**Торговое название**  
ПАЛОРА®

**Международное непатентованное название**  
Нет

**Лекарственная форма**  
Сироп, 100 мл

**Состав**  
5 мл сиропа содержат  
*активное вещество* – пассифлоры травы экстракт жидкий 694.444 мг,  
*вспомогательные вещества*: сахар кристаллический, глицерин, спирт  
этиловый 96%, метилпарабен, пропилпарабен, вода очищенная

**Описание**  
Прозрачная жидкость темно-коричневого цвета

**Фармакотерапевтическая группа**  
Психотропные препараты. Снотворные и седативные препараты другие  
Код АТХ N05CM

**Фармакологические свойства**  
Экстракт Пассифлоры (страстоцвет) получают из растения *Passiflora incarnata*. Пассифлоры экстракт содержит группу алкалоидов, таких как гарман, гармол, гармалин (галлюциноген), гармин, гармалол и арибин, и некоторые флавоноиды, такие как витексин и ориентин. Экстракт также содержит апигенин, обладающий спазмолитической активностью. Эти вещества обладают седативным, снотворным, обезболивающим, анксиолитическим и спазмолитическим свойствами.

Поскольку натуральный пассифлоры экстракт не вызывает зависимости и побочных явлений, он является более безопасным по сравнению с транквилизаторами и барбитуратами.

ПАЛЮРА® оказывает седативное действие на центральную нервную систему в период абстиненции. Препарат устраняет невротические расстройства, улучшает настроение, сон, повышает трудоспособность, уменьшает головокружение, шум в ушах.

### **Показания к применению**

- неврастения
- вегето-сосудистая дистония
- климактерический и преклимактерический периоды
- повышенная нервозность
- нарушения сна
- симптоматическая артериальная гипертензия
- эпилепсия (как вспомогательное средство)
- болезнь Меньера (в составе комплексной терапии)

### **Способ применения и дозы**

#### *Взрослые*

Для достижения успокоительного действия - по 5-10 мл/1-2 мерной ложки перед едой 3 раза в день.

При расстройстве сна принимать по 10 мл препарата, перед сном. Средний курс лечения - 20-30 дней.

Максимальная разовая доза - 10 мл, суточная - 30 мл.

### **Побочные действия**

- сонливость
- чувство усталости
- головокружение
- мышечная слабость
- аллергические реакции
- экзантема
- расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, спазмы, изжога, диарея, запор)

### **Противопоказания**

- индивидуальная чувствительность к одному из компонентов препарата
- заболевания печени
- хронический алкоголизм
- хроническая почечная недостаточность
- травмы головного мозга
- детский и подростковый возраст до 18 лет
- беременность и период лактации

### **Лекарственные взаимодействия**

Прием препарата с веществами, угнетающими центральную нервную систему (алкоголь, барбитураты, транквилизаторы) может вызвать усиление седативного и снотворного эффекта. Следует избегать применения препарата ПАЛОРА® вместе с дисульфирамом. У людей, принимающих аспартам (при фенилкетонурии), может появиться осадок в моче.

### **Особые указания**

С осторожностью назначают при тяжёлых органических заболеваниях желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), злокачественные опухоли, желчно-каменная болезнь, хронический панкреатит), при сахарном диабете.

*Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами*

В период лечения необходимо воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Передозировка**

*Симптомы:* в начале - сонливость, чувство подавленности, позднее – тошнота, ощущение тяжести в желудке.

*Лечение:* симптоматическое. Специфического антидота нет.

### **Форма выпуска и упаковка**

100 мл препарата помещают в стеклянный темный флакон с завинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия.

На флакон наклеивают самоклеящуюся этикетку.

1 флакон вместе с мерной ложкой и инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25° С, в сухом, защищённом от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Срок хранения**

3 года

Не применять по истечении срока хранения

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

### **Производитель**

АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика»  
Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. Шевченко 162 Е.

**Упаковщик**

АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика»  
Республика Казахстан  
г. Алматы, ул. Шевченко 162 Е.

**Владелец регистрационного удостоверения**

АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика»  
Республика Казахстан  
г. Алматы, ул. Шевченко 162 Е.

***Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)***

АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика»  
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 162 Е.  
Номер телефона: (+7 727) 399-50-50  
Номер факса: (+7 727) 399-60-60  
Адрес электронной почты [nobel@nobel-aff.kz](mailto:nobel@nobel-aff.kz)